

ПОДГОТОВКА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

РЕНГЕНСЛУЖБА

ФЛЮОРОГРАФИЯ

Подготовка пациента

Не требуется.

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЛЁГКИХ/КОСТЕЙ/СУСТАВОВ

Подготовка пациента

Не требуется.

РЕНТГЕНОСКОПИЯ ОРГАНОВ ЖКТ

Подготовка пациента

- За день до обследования диета (негазированные напитки, чай, кофе, сок без мякоти, прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирные кисломолочные продукты, яйца, сахар, мёд; остальные продукты запрещены к употреблению).
- Приём препарата “Мовипреп” по инструкции: развести одно саше А и одно Б в небольшом количестве воды, далее долить воды до 1 литра и с 20:00 до 21:00 принимать по 250 мл каждые 15 минут. После принятого раствора, принять 15 мл ЭСПУМИЗАНА и запить 500 мл питьевой воды. В день осмотра повторный приём “Мовипреп” в 6:00 по вышеописанной инструкции. Данные рекомендации даны для времени проведения исследования с 9:00 до 11:00.

МАММОГРАФИЯ

Подготовка пациента

При наличии у женщины менструального цикла исследование проводится на 6-12 день.

КТ БЕЗ КОНТРАСТА (ВСЕ, КРОМЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА)

Подготовка пациента

Не требуется.

КТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО БЕЗ КОНТРАСТА

Подготовка пациента

- За день до обследования диета (негазированные напитки, чай, кофе, сок без мякоти, прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирные кисломолочные продукты, яйца, сахар, мёд; остальные продукты запрещены к употреблению).
- Приём препарата “Мовипреп” по инструкции: развести одно саше А и одно Б в небольшом количестве воды, далее долить воды до 1 литра и с 20:00 до 21:00 принимать по 250 мл каждые 15 минут. После принятого раствора, принять 15 мл ЭСПУМИЗАНА и запить 500 мл питьевой воды. В день осмотра повторный приём “Мовипреп” в 6:00 по вышеописанной инструкции. Данные рекомендации даны для исследования с 9:00 до 11:00.

КТ С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Важно:

Подготовка пациента

- Исследование проводится до рентгенологических исследований пищеварительного тракта с бариевой взвесью либо через 3-5 дней после.
- Сообщить врачу-рентгенологу о наличии аллергических реакций на йод-содержащие контрастные препараты.
- При себе иметь анализ креатинина, для расчёта скорости клубочковой фильтрации: низкие значения представляют опасность в плане развития острой почечной недостаточности – рекомендованы альтернативные методы визуализации.
- Пациентам с заболеваниями щитовидной железы: гипертиреоз, болезнь Грейвса, латентный гипертиреоз у пациентов с автономной аденомой, папиллярный рак щитовидной железы, фолликулярный рак щитовидной железы рекомендовано применение тиамазола 30 мг за день до исследования и в течение 28 дней или пехлората натрия 300 мг за день до исследования и в течение 8-14 дней.
- Пациентам, принимающим метформин-содержащие препараты (глюкофаж, сиофор и т.д.), следует прекратить прием этих препаратов с момента введения контрастного средства и возобновить прием через 48 часов после исследования.
- Предупредить пациента незамедлительно сообщить лечащему врачу, если после введения контрастного вещества будут следующие симптомы: зуд кожных покровов, глаз, чувство нехватки воздуха, онемение, отёк языка и/или мягких тканей шеи, головокружение резкая головная и/или за грудиной боль, чувство “провалов” в области сердца.

КТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА С ВНУТРИВЕННЫМ БОЛЮСНЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

Важно:

Подготовка пациента

- За день до обследования диета (негазированные напитки, чай, кофе, сок без мякоти, прозрачные бульоны, отварное мясо и птица, нежирные кисломолочные продукты, яйца, сахар, мёд; остальные продукты запрещены к употреблению).
- Приём препарата “Мовипреп” по инструкции: развести одно саше А и одно Б в небольшом количестве воды, далее долить воды до 1 литра и с 20:00 до 21:00 принимать по 250 мл каждые 15 минут. После принятого раствора, принять 15 мл ЭСПУМИЗАНА и запить 500 мл питьевой воды. В день осмотра повторный приём “Мовипреп” в 6:00 по вышеописанной инструкции. Данные рекомендации даны для исследования с 9:00 до 11:00.
- Исследование проводится до рентгенологических исследований пищеварительного тракта с бариевой взвесью либо через 3-5 дней после.
- Сообщить врачу-рентгенологу о наличии аллергических реакций на йод-содержащие контрастные препараты.
- При себе иметь анализ креатинина, для расчёта скорости клубочковой фильтрации: низкие значения представляют опасность в плане развития острой почечной недостаточности – рекомендованы альтернативные методы визуализации.

- Пациентам с заболеваниями щитовидной железы: гипертиреоз, болезнь Грейвса, латентный гипертиреоз у пациентов с автономной аденомой, папиллярный рак щитовидной железы, фолликулярный рак щитовидной железы рекомендовано применение тиамазола 30 мг за день до исследования и в течение 28 дней или пехлората натрия 300 мг за день до исследования и в течение 8-14 дней.
- Пациентам, принимающим метформин-содержащие препараты (глюкофаж, сиофор и т.д.), следует прекратить прием этих препаратов с момента введения контрастного средства и возобновить прием через 48 часов после исследования.
- Предупредить пациента незамедлительно сообщить лечащему врачу, если после введения контрастного вещества будут следующие симптомы: зуд кожных покровов, глаз, чувство нехватки воздуха, онемение, отёк языка и/или мягких тканей шеи, головокружение резкая головная и/или за грудиной боль, чувство “провалов” в области сердца.